INSTRUCCIONES DEL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE HECES

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la recolección. Siga las instrucciones cuidadosamente.

PRECAUCIÓN

Los envases que ha recibido pueden contener soluciones químicas que podrían irritar su piel. Evite el contacto con estas soluciones. NO BEBA LA SOLUCIÓN.

DIRECCIONES

1. NO use antiácidos, bismuto, medicamentos antidiarreicos o laxantes aceitosos antes de recolectar su muestra. Si está usando alguno de estos, suspenda el uso y asegúrese de que estén fuera de su sistema antes de recolectar su muestra (al menos 48 horas para bario, 24 horas para otros).
2. Si se le pide que tome una muestra más de una vez, hágalo en días diferentes. NO recopile todas las muestras en el mismo día.
3. Encuentre un recipiente limpio y seco o use el recipiente de recolección proporcionado que se puede desechar cuando se completa la recolección.
4. Pase su materia fecal directamente al contenedor de recolección. NO tome la muestra de la taza del inodoro ni la contamine con orina.

   Abra el recipiente (que contiene el líquido) que le dieron en la clínica.

   Usando la cuchara de recolección integrada en la tapa, coloque una cucharada de heces en el recipiente hasta que el líquido alcance la línea roja.

   NO PASAR POR ENCIMA DE LA LINEA ROJA.

   Tome partes de las heces con sangre, viscosas o acuosas, si están presentes.

   (Si tiene un recipiente sin solución, simplemente coloque una pequeña cantidad de heces en ese recipiente. Se puede usar un utensilio de plástico, etc. para transferir las heces al recipiente.)



5. Revuelca el contenido de su recipiente (si tiene solución) con la cuchara, hasta que la muestra y el líquido estén bien mezclados.

   Apriete la tapa y agite vigorosamente para mezclar aún más el contenido.
6. Todas las muestras deben etiquetarse con el nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, fecha de recolección y hora de recolección.
7. Si se le pidió que recolectara una segunda muestra, repita los pasos del 3 al 6 en un día diferente.
8. Almacene y transporte las muestras de manera adecuada para las pruebas solicitadas (consulte la tabla a continuación).
9. Devuelva las muestras al laboratorio de su clínica lo antes posible.
10. La prueba toma alrededor de 48 horas después de recibir la(s) muestra(s).
11. Solo se le informarán los resultados anormales (a través del proveedor que los solicitó o de un representante de la clínica).

INSTRUCCIONES DEL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE HECES

✓	Prueba solicitada	Contenedor de muestras	Temperatura de almacenamiento
	Panel Gastrointestinal, Heces	Naranja-Para-Pack C&S Llene hasta la línea roja con heces. ** **¡NO PASES PRO ENCIMA DE LA LÍNEA ROJA!** Y Contenedor simple estéril con muestra del tamaño de una nuez. ****Las muestras de heces formadas no son aceptables.**	Regrese a la clínica o laboratorio dentro de 1 hora de la recolección o refrigere por no más de 2 días.
	C.dificil, ADN citotoxigénico, Heces	Heces frescas en recipiente estéril. ****Las muestras de heces formadas no son aceptables.**	Refrigerar menos de 2 días
	Antígeno Giardia	Rosa-Para-Pack Formalina neutra tamponada al 10% Llene hasta la línea roja con heces. ** **¡NO PASES PRO ENCIMA DE LA LÍNEA ROJA!**	Temperatura ambiente
	Óvulos y Parásitos (O&P)	Verde-Para-Pack ECOFIX Llene hasta la línea roja con heces. ** **¡NO PASES PRO ENCIMA DE LA LÍNEA ROJA!**	Temperatura ambiente
	Antígeno H. pylori, Heces	Naranja-Para-Pack C & S Llene hasta la línea roja con heces. ** **¡NO PASES PRO ENCIMA DE LA LÍNEA ROJA!**	Temperatura ambiente
	C.difícil cultura	Naranja -Para-Pack C & S Llene hasta la línea roja con heces. ** **¡NO PASES PRO ENCIMA DE LA LÍNEA ROJA!**	Temperatura ambiente
	Cultivo de heces de rutina	Naranja -Para-Pack C & S Llene hasta la línea roja con heces. ** **¡NO PASES PRO ENCIMA DE LA LÍNEA ROJA!**	Refrigerar